

# Flubenol<sup>TRADEMARK</sup>

Matolääke kissoille ja koirille

Flubenol  
purutabletti  
koirille



Flubenol  
pasta  
kissoille ja  
koirille

**ORION**  
**PHARMA**

HYVINVOINTIA RAKENTAMASSA



## Muista häätää sisäloiset säännöllisesti

Säännöllinen sisäloislääkitys kuuluu jokaisen koiran ja kissan perusterveydenhuoltoon. Syynä on ennen kaikkea lemmikin oma hyvinvointi, mutta on hyvä muistaa, että osa koirilla ja kissoilla esiintyvistä sisäloisista voi tarttua myös ihmisiin. Pahimmillaan, vaikkakin erittäin harvoin, tartunta voi aiheuttaa vakavan sairastumisen.

## Oireet

Sisäloistartunta voi aiheuttaa eläimelle ripulointia, oksentelua ja vatsan turvotusta. Karva saattaa menettää kiiltoaan ja yleiskunb laskea. Loistartunta voi olla pentuikäiselle eläimelle jopa kohtalokas. Täysikasvuisen eläimen loistartunta sen sijaan saattaa olla lähes oireeton.

Loishäätö tuhoaa eläimen suolistossa hoitohetkellä olevat sisäloiset, mutta se ei suojaa uusilta tartunnoilta. Loishäädöstä on tärkeää huolehtia säännöllisesti, vaikka oireita ei ilmenisi.

## Ota tarvittaessa yhteys eläinlääkäriin

Lemmikin elämäntapa määrää, kuinka usein loishäätö on tarpeen antaa. Ulkona vapaasti liikkuva, hiiriä saalistava kissa saa herkemmin loisia kuin sisäkissa, ja se onkin syytä loislääkitä tiheämmin. Samoin metsästyskoirat ja ahkerasti näyttelyissä käyvät koirat ovat alttiimpia loistartunnoille. Mikäli lemmikin kanssa matkustetaan ulkomaille, on tehokas loishäätöohjelma tarpeen. Eläinlääkäriltä saa ohjeet matkustavan koiran tarpeellisesta loishäädöstä.

# Annostus

## Flubenol tabletti koirille

Päiväannos on 1 tabletti / 10 kg kerran vuorokaudessa kahden tai kolmen päivän ajan.

Painonmukainen annos annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä, jolloin se tehoaa myös heisimatoihin. Kahden päivän kuuri riittää suolinkais- tai hakamatotartuntojen hoitoon.

Pakkaus (6 tabl.) riittää 20 kg:n painoiselle koiralle 3 päivän hoitoon. Hyvänmakuiset tabletit maistuvat koirille sellaisenaan, mutta ne voidaan myös sekoittaa ruokaan. Tableteissa on jakourteet, jotka mahdollistavat tarkan annostelun.



# Annostelutaulukko Flubenol purutableteille

Koiran paino	Päiväannos tablettina	3 päivän kuuri yht.
2,5 kg	1/4	3/4
5 kg	1/2	1 1/2
7,5 kg	3/4	2 1/4
10 kg	1	3
15 kg	1 1/2	4 1/2
20 kg	2	6
25 kg	2 1/2	7 1/2
30 kg	3	9
35 kg	3 1/2	10 1/2
40 kg	4	12

## Flubenol pasta kissoille ja koirille

Päiväannos on 1 annosruiskun viivaväli eli 0,5 ml/kg/vrk. Flubenol-ruisku sisältää 7,5 ml pastaa. Yksi ruiskullinen riittää 5-kiloiselle kissalle tai koiralle 3 päivän hoitoon. Pasta soveltuu erityisesti kissoille sekä pienikokoisille koirille.

## Flubenol-valintaohje

	Koira	Kissa
Suolinkainen	•	•
Hakamato	•	•
Taeniaheisimato	•	•
Piiskamato	•	



**JANSSEN**  
ANIMAL HEALTH



**FLUBENOL VET 44 mg/ml** oraalipasta, 220 mg purutabletti **Vaikuttava aine:** Flubendatsoli. Flubendatsoli vaikuttaa nopeasti isäntäeläimen ruoansulatuskanavassa olevien loisten solusisäisiin mikroputkiloihin, jolloin loisten ravinnonsaanti häiriytyy. Loiset kuolevat ja poistuvat ulosteen mukana eläimen elimistöstä. **Kohde-eläinlajit:** Oraalipasta: Kissa ja koira. Purutabletti: Koira. **Käyttöaiheet:** Sisäloisten häätö: Sukkulamadot; *Toxocara cati* (kissan suolinkainen), *Toxocara canis* (koiran suolinkainen), *Toxascaris leonina* (koiran ja kissan suolinkaisia). Hakamadot: *Uncinaria stenocephala* (koiran ja kissan hakamatoja), *Ancylostoma tubaeforme* (kissan hakamato), *Ancylostoma caninum* (koiran hakamato). Piiskamato: *Trichuris vulpis* (koiran piiskamato). Heisimadot: *Taenia taeniaeformis* (kissan heisimato), *Taenia pisiformis* (koiran heisimato). **Haittavai-  
kutukset:** Kissalla voi esiintyä syljen eritystä ja lievää, ohimenevää ripulia. Koiralla saattaa esiintyä ohimenevää oksentelua ja lievää ripulia. **Käyttöön liittyvät erityiset varoitimet:** Ei ole. **Käyttö tiineyden ja laktation aikana:** Voidaan käyttää. **Annostus ja antotapa:** 22 mg/kg

suun kautta. Sekatartunta: Oraalipasta: 0,5 ml/kg kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä. Purutabletti: 1 tabletti/ 10 kg kerran päivässä kolmena peräkkäisenä päivänä. Suolinkais- ja hakamatotartunnat: Oraalipasta: 0,5 ml/kg kerran päivässä kahtena päivänä. Purutabletti: 1 tabletti/10 kg kerran päivässä kahtena päivänä. Annostelun ajankohdat: Pennut: 2–3, 4, 6, 8 ja 11–12 viikon iässä, puolen vuoden iässä ja tämän jälkeen aikuiselle koiralle tarkoitettuna loishäätöohjelman mukaan. Nartut: Juuri ennen astutusta, koiralle noin 42. tiineyspäivänä ja ja penikoimisen jälkeen sekä emokissalle että -koiralle samaan aikaan pentujen kanssa tai eläinlääkärin antaman ohjeen mukaan. Muut aikuiset kissat ja koirat: Yksilöllisen tarpeen mukaan, yleensä 1–2 kertaa vuodessa. Ennen rökotusta tai aina, kun on todettu, että eläimellä on matoja. **Erityiset varoitimenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava:** Kädet on pestävä lääkityksen jälkeen. **Pakkaukset:** Oraalipasta: 7,5 ml. Purutabletti: 6 tabl. **Myyntiluvan haltija:** Orion Oyj, Espoo **Valmistaja:** Janssen-Cilag

01/2009 KOODI 6886

**ORION**  
PHARMA

ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET  
PL 425, 20101 Turku, puh. 010 4261, faksi 010 426 7771, [www.flubenol.fi](http://www.flubenol.fi)